

BIJ INSCHUREN

ZIEKTEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	VERNEVELEN	ONDERDOMPELEN (1-2 MIN.)	TOEPAS- SINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
PHOMA (ZWARTROT)	Tecto	thiabendazool	80 ml in 20 l water per ton wortels	200ml in 100 l water		zie (1)	
SCLEROTINIA	Dagonis	difenoconazool+fluxapyroxad	75-100 ml per ton wortels	250 ml in 100 l water	1		
	Luna Privilege	fluopyram	10 ml per ton wortels	20 ml in 100 l water	1		21 dagen
	Switch, Serenva	cyprodinil+fludioxonil	36 g per ton wortels	90 g in 100 l water	1		
	Contans WG	<i>Coniothyrium minitans</i>	50 g in 10-20 l water per ton wortels		1	bio	
PHYTOPHTHORA	Revus, Pergado V, Advangro, Otaprio, Pesonia	mandipropamid	2 ml per ton wortels	5 ml in 100 l water			21 dagen

KRAAGBEHANDELING

PLAGEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
MINEERVLIEGEN	Tracer	spinosad	0,5 ml/m ²	1	bio	18 dagen
	Exalt, Inrance	spinetoram	5 ml/m ²	1		18 dagen
	Boomerang, Conserve Pro	spinosad	2 ml/m ²	1	bio	18 dagen
ZIEKTEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
PHYTOPHTHORA	Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, Zoxis 250 SC, Chamane 250 SC	azoxystrobin	1 ml/m ²		zie (2)	
	Revus, Pergado V, Advangro, Otaprio, Pesonia	mandipropamid	0,5 ml/m ²	1		21 dagen
	Previcur Energy	fosethyl+propamocarb	20 ml/m ²	1	zie (3)	21 dagen
PYTHIUM	Previcur Energy	fosethyl+propamocarb	20 ml/m ²	1	zie (3)	
SCLEROTINIA	Dagonis	difenoconazool+fluxapyroxad	15 ml/m ²	1		21 dagen
	Luna Privilege	fluopyram	1 ml/m ²	1		21 dagen
	Switch, Serenva, Society, Speech	cyprodinil+fludioxonil	4,5 g/m ²	1		21 dagen
	Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	0,25 g/m ²		bio	

IN DE VOEDINGSOPLOSSING/BODEM

PLAGEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS voor 100 l voedingsoplossing	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
AALTJES	Nemguard GR	knoflookextract	20 kg/ha	1	inwerken in de bodem, bio	
RUPSEN	Turex WG	<i>Bacillus thur. ssp. aizawai GC-91</i>	1 kg/ha	3	interval minstens 7 dagen, bio	
ZIEKTEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS voor 100 l voedingsoplossing	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
PHYTOPHTHORA	Paraat	dimethomorf	0,5g/100 l			
	Previcur Energy	fosethyl+propamocarb	40 ml	1	zie (3)	21 dagen
	Proplant	propamocarb	12,5 ml			
	Revus, Pergado V	mandipropamid	0,75 ml	1		21 dagen

(1) Tecto: het is noodzakelijk zeer strikt de goede agrarische praktijken toe te passen!

(2) Azoxystrobin: enkel voor Norios en Zoxis 250SC: max 1 toepassing/teelt - wachttijd 21 dagen.

(3) Previcur Energy: om overschrijdingen van MRL te voorkomen, is het verboden om fosethyl-Al toe te passen tijdens de opslag (bewaring) of tijdens de forcerie indien de wortels reeds op het veld met fosethyl-Al behandeld werden.

* Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof.

* Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten.

* De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document "Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels" beschikbaar op www.fytoweb.be.

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op fytoeweb.be en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

PLAGEN

BZ= bufferzone

	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per ha	TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHT-TIJD
BLADLUIZEN	Movento (100 SC), Batavia	spirotriamet	0,45 l	2 per 12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 1 m - zie (3)	50 dagen
	Bandaka, Ultor 150 OD	spirotriamet	0,5 l	2 per 12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 1 m - zie (3)	14 dagen
	Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 100 CS, Ninja, Kendo, Kusti	lambda-cyhalothrin	0,1 l	zie (1)	zie (1)	14 dagen
	Decis 15 EW, Patriot Protech, Split	deltamethrin	0,83 l	3	interval 7 dagen - BZ: 5 m - zie (2)	7 dagen
	Decis EC 2,5 (2)	deltamethrin	0,5 l	3 per 12 mnd	interval 7 dagen - BZ: 10 m - zie (2)	7 dagen
	Delete	deltamethrin	0,5 l	3 per 12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 10 m	7 dagen
	Evure, Mavrik	tau-fluvalinaat	0,2 l	1 per 12 mnd	BZ: 10 m	14 dagen
	Pirimor	pirimicarb	0,4 kg	2	BZ: 1 m	7 dagen
	Bio-Pyretrex	pyrethrinen+piperonylbutoxide	5 l	2	interval 7 dagen - BZ: 10 m	2 dagen
NAAKTSLAKKEN	Ferrex RB, Escar-Go	ijzerfosfaat	6 kg	5-4 per 12 mnd	BZ: 1 m	
	Firescale, Ironclad	ijzerfosfaat	7 kg	4 per 12 mnd	interval 7 dagen	
	Sluux, Derrex, Derrex high perfor., Ironmax Pro, Neu 1181 m	ijzerfosfaat	7 kg	1-4 per 12 mnd	BZ: 1 m	
RITNAALDEN	zaadbehandeling: Force 200 CS	tefluthrin		1	enkel voor behandeling van omhulde zaaizaden	
RUPSEN	Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 100 CS, Ninja, Kendo, Kusti	lambda-cyhalothrin	0,075 l	zie (1)	zie (1)	14 dagen
	Decis 15 EW, Patriot Protech, Split	deltamethrin	0,5 l	3	interval 7 dagen - BZ: 5 m - zie (2)	7 dagen
	Decis EC 2,5 (2)	deltamethrin	0,5 l	3 per 12 mnd	interval 7 dagen - BZ: 10 m - zie (2)	7 dagen
	Delete	deltamethrin	0,5 l	3 per 12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 10 m	7 dagen
	Bio-Pyretrex	pyrethrinen+piperonylbutoxide	5 l	2	interval 7 dagen - BZ: 10 m, bio	2 dagen
	Xentari WG, Florbac	<i>Bacillus thur. ssp. aizawai</i> ABTS-1857	0,75-1 kg	7 per 12 mnd	interval 7 dagen, bio	0 dagen
	Dipel DF, Lepinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki</i>	0,5-1 kg	8	interval 7 dagen, bio	0 dagen
	Florbac	<i>Bacillus thuringiensis ssp. aizawai</i>	1 kg	7	interval 7 dagen, bio	
	Turex WG	<i>Bacillus thuringiensis ssp. aizawai</i>	1 kg	3	interval 7 dagen, bio	0 dagen
WANTSEN	Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 100 CS, Ninja	lambda-cyhalothrin	0,075 l	zie (1)	zie (1)	14 dagen
WITLOOF-MINEERVLIEG	Movento (100 SC), Batavia	spirotriamet	0,45 l	2 per 12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 1 m	50 dagen
	Decis 15 EW, Patriot Protech, Split	deltamethrin	0,83 l	3	interval 7 dagen - BZ: 5 m - zie (2)	7 dagen
WOLLIGE WORTELLUIS	Movento (100 SC), Batavia	spirotriamet	0,75 l	2 per 12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 1 m - zie (3)	50 dagen
	Bandaka, Ultor 150 OD	spirotriamet	0,5 l	2 per 12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 1 m - zie (3)	50 dagen

(1) Lambda-cyhalothrin: enkel voor Karate Zeon, Ninja: max. 2 toepassingen/teelt - BZ: 10 m - enkel voor Karis 100 CS, Korado 100 CS: max. 3 toepassingen/teelt - BZ: 20 m.

(2) Demetrina 25 EC, Mezene, Scatto, Splendour BZ 5m, interval 7 dagen, Decis 15EW, Patriot protech, Split BZ: 5m interval 7dagen

(3) Nog toegelaten tot 30/10/2025

BACTERIE

BZ= bufferzone

	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per ha	AANTAL TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHTTIJD
ROTTE KROPPEN PSEUDOMONAS, ERWINIA	Hydro WG, Koperhydroxide WG, Ko-Plus 40	koperhydroxide	2,5 kg	2/12 mnd	interval 7 dagen - BZ: 20 m, bio	3 weken
	Hydro Super 25 WG, Copernico Hibio, Blue shield Hibio	koperhydroxide	4 kg	2/12 mnd	interval 7 dagen - BZ: 5 m, bio	3 weken

(1) Enkel voor Cuperit, Cuprex 50 %, Curvata: BZ: 2 m - enkel voor Cuprex 50 % WG: BZ: 5 m.

* Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof.

* Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten.

* De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document "Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels" beschikbaar op www.fytoweb.be.

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op fytoeweb.be en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

ZIEKTEN

BZ= bufferzone

	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per ha	AANTAL TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHTTIJD
ALTERNARIA	Geyser e.a.	difenoconazool	0,5 l	zie (3)	zie (2)	30 dagen
	Ortiva Top	azoxystrobin+difenoconazool	1 l	1	BZ: 1 m	30 dagen
	Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, Zoxis 250 SC, Chamane	azoxystrobin	1 l	1	nevenwerking tegen echte meel-dauw - zie (4)	21 dagen
	Signum, Terminett	boscalid+pyraclostrobin	1,5 kg	2	interval 14-28 dagen - BZ: 10 m - max. 1 kg boscalid/ha/12 maanden	14 dagen
ECHTE MEELDAUW	Eminent, Belrose, Galileo, Rivior	tetraconazool	0,8 l	1		30 dagen
	Geyser e.a.	difenoconazool	0,5 l	zie (3)	zie (3)	30 dagen
	Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	2,5 kg	6	bio	
	Ortiva Top	azoxystrobin+difenoconazool	1 l	1	BZ: 1 m	30 dagen
	Karma, Karma SG, APC-09CD	kaliumwaterstofcarbonaat	3 kg	8	interval 7 dagen, bio	1 dag
	Cosavet, Hermovit, Kumulus WG, Thiovit Jet	zwavel	5 kg	6	preventief interval 10 dagen, bio	0 dagen
PHYTOPHTHORA	Aliette WG, Fosevel	fosethyl	5 kg	2	interval 15 dagen - zie (4) BZ: 1 m	14 dagen
ROEST	Eminent, Belrose, Galileo, Rivior	tetraconazool	0,8 l	1		30 dagen
	Geyser e.a.	difenoconazool	0,5 l	zie (3)	zie (2)	30 dagen
	Ortiva Top	azoxystrobin+difenoconazool	1 l	1	BZ: 1 m	30 dagen
	Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, Zoxis 250 SC	azoxystrobin	1 l	1	nevenwerking tegen echte meel-dauw - zie (3)	21 dagen
	Signum, Terminett	boscalid+pyraclostrobin	1,5 kg	2	interval 14-28 dagen BZ: 10 m - max. 1 kg boscalid/ha/12 maanden	14 dagen
SCLEROTINIA	Luna Sensation	fluopyram+trifloxystrobin	0,6 l	1	BZ: 5 m - zie (1), geen kardoen, selderij en knolvenkel als volgtteelt	21 dagen
	Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	2,5 kg	6	bio	
	Signum, Terminett	boscalid+pyraclostrobin	1,5 kg	2	interval 14-28 dagen BZ: 10 m - max. 1 kg boscalid/ha/12 maanden	14 dagen
	Contans WG (2 kg op 5 cm diepte, 4 kg op 10 cm)	<i>Coniothyrium minitans</i>	2-4 kg		inwerken in de bodem voor zaaien	0 dagen
ZWARTROT RHIZOCTONIA	Maxim 480 FS	fludioxonil	100 ml / 100 kg zaden	1	zaadbehandeling	
	Trianum-GR	<i>Tricoderma harzianum T-22</i>		0,75kg/m ²	4 per 12 mnd, bio	
BACTERIËN	Blue shield hibio, Copernico hibio	koperhydroxide	4 kg/ha	2/12mnd	interval 7 -10 dagen - BZ:5 m, bio	

(1) Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.

(2) Geyser e.a.: Geyser, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Square 250 EC, Tapier, Tapier 250 EC: enkel voor Tapier 250 EC: toepassen vanaf begin wortelontwikkeling (diameter > 0,5 cm) - max. 1 toep./12 maanden - BZ: 10 m - enkel voor Geyser, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Square 250 EC, Tapier: max. 1 toepassing/teelt.

(3) Azoxystrobin: enkel voor Ortiva, Zakeo 250 SC: BZ: 5 m - enkel voor Norios, Zoxis 250 SC: stadium: kiembladeren-typische vorm en grootte van de wortel bereikt - BZ: 20 m.

(4) Aliette WG: om overschrijdingen van de MRL te voorkomen, kan fosetyl-aluminium na een toepassing op het veld, niet meer toegepast worden vóór bewaring of tijdens de forcerie - Wachtijd tussen toepassing in witloofwortelteelt en planten of zaaien van volggewas: 30 dagen.

* Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof.

* Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten.

* De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document "Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels" beschikbaar op www.fytoweb.be.

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op www.fytoweb.be en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

ONKRUIDEN

BZ= bufferzone

	FASE	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per ha	AANTAL TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHT-TIJD
	VOOR ZAAIEN	Bonalan (inwerken in de bodem)	benfluralin	8 l	1	BZ: 20 m (min. 50 % driftreductie) <i>zie (1) (6)</i>	
	VOOR OPKOMST	Kerb 400 SC, Solitaire, Setanta SC	propyzamide	2,8-3,1 l		max. 1,25 kg propyzamide/ha per 12 maanden	
		Boa, Wopro penoxulam	penoxsulam	0,75 l		gefractioneerd - toepassen van droog zaad tot 5 bl. - BZ: 1 m	
NA OPKOMST Om het werkingsspectrum te vergroten worden de middelen best gecombineerd in een lage dosissysteem opm.: AZ 500 en Dual Gold/ Lecar of Frontier Elite niet mengen	droog zaad 5-bladstadium	Boa, Wopro penoxulam	penoxsulam	0,75 l		gefractioneerd toepassen	
	kiembladstadium sluiten van de rijen	Safari	triflusaluron-methyl	5-30 g		Safari: max. 60 g/ha/teelt - interval 7-10 dagen- BZ: 1 m - <i>zie (7)</i>	
		Shiro 500	triflusaluron-methyl	30g		Shiro 500: interval 7 dagen - BZ: 10 m - <i>zie (7)</i>	
	kiemlobstadium- 6 bladstadium	AZ 500	isoxaben	0,2 l		eventueel gefractioneerd - BZ: 10 m - <i>zie (1)</i>	
	na-opkomst	Kerb 400 SC, Solitaire, Setanta SC	propyzamide	2,8-3,1 l		max. 1,25 kg propyzamide/ha per 12 maanden - BZ:1m	
	1-8 bladstadium	Frontier Elite, Arundo, Grometa	dimethenamide-p	0,1-0,6 l	4	max. 1 kg dimethenamide-p/ha per 12 maanden - <i>zie (3)</i>	
	1-8 bladstadium	Dual Gold, Codal, Efica 960 EC, Lecar	S-metolachloor	0,1-0,6 l	3	max. 1,3 l/ha/12 mnd - interval 8 d. - BZ: 10 m - <i>zie (4)</i>	
	2-4 bladstadium	Cito Pro Global	azijnzuur	250 l	6/12 mnd	interval 7 dagen, BZ: 5m	
		Herbistop Super	pelargonzuur	125 l/1000 l	4/12 mnd	interval 30 dagen, BZ: 10 m	
		Titus	rimsulfuron	30 g	2/12 mnd	interval 10 dagen	60 dagen
	Grassen	Cito Pro Global	azijnzuur	250 l	6/12 mnd	interval 7 dagen, BZ: 5m	
		Herbistop Super	pelargonzuur	125 l/1000 l	4/12 mnd	interval 30 dagen, BZ: 10 m	
		Titus	rimsulfuron	30 g	2/12 mnd	interval 10 dagen	60 dagen
		Pantera	quizalofop-p-tefuryl	2,25 l	1	na opkomst - BZ: 1 m (min. 90% driftreductie)- <i>zie (4)</i>	60 dagen
Centurion (1 l tegen kweek)		clethodim	0,5 l	1/12 mnd	na opkomst - BZ: 20 m (min. 50% driftreductie)	56 dagen	
Select Prim (2 l tegen kweek)		clethodim	1 l	1/12 mnd	na opkomst - BZ: 20 m (min. 50% driftreductie)	56 dagen	
niet mengen met andere herbiden erkend in na-opkomst:	Fusilade Max	fluazifop-p-butyl	1-3 l	2	max. 375 g fluazifop-p-butyl/ha per 12 maanden - BZ: 1 m	56 dagen	
	Targa Prestige, Targa Megamax	quizalofop-p-ethyl	1-3 l	1	toepassen na opkomst - <i>zie (5)</i>	28 dagen	

(1) Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.

(2) Frontier Elite, Arundo, Grometa: interval 7-10 dagen - voorkeur verlaagde dosis van maximum 1 l/ha/teelt - BZ: 20 m - geen werking op varkensgras.

(3) Dual Gold: om grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op zand en lemig zandgronden (zoals aangegeven op de Bodemkaart van België, textuurklasse "Z" en "S").

(4) Pantera: Niet mengen met een hulpstof. Respecteer een wachttijd van 120 dagen voor het zaaien of planten van de volgende teelt.

(5) Targa Prestige, Targa Megamax: de aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt.

(6) Benfluralin nog toegelaten tot 13/05/2024

(7) triflusaluron-methyl nog toegelaten tot 21/08/2024

UITVLOEIERS

	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per 100 l oplossing	AANTAL TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHTTIJD
NA OPKOMST	Trend 90	isodecyl-alcohol ethoxylaat	50-100 ml		<i>zie (1)</i>	i.f.v. het middel waarmee gemengd wordt
	Gerezi, Kimla	geëthoxyleerd triglyceride 10 EO	150 ml	1		7 dagen
	Vivolt	isodecyl-alcohol ethoxylaat	100 ml		<i>zie (1)</i>	

(1) In menging met een erkend herbicide (100 ml bij spuitvolume 150-400 l/ha, 50 ml spuitvolume > 400 l/ha)

* Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof.

* Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten.

* De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document "Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels" beschikbaar op www.fytoweb.be.

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op fytoeweb.be en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.